

Ważne informacje – nie wyrzucać!

Symago (agomelatyna)

**w leczeniu dużych epizodów
depresyjnych u dorosłych**

Broszura dla pacjentów

Symago jest lekiem przeciwdepresyjnym, który pomaga leczyć depresję.

Aby zoptymalizować leczenie, należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących stosowania leku Symago (dawka, czas trwania leczenia, ustalenie terminów wizyt kontrolnych, badania krwi).

Zalecenia jak unikać występowania działań niepożądanych dotyczących wątroby

Symago może powodować działania niepożądane, w tym zmiany czynności wątroby.

Ta broszura zawiera zalecenia:

- **jak unikać występowania działań niepożądanych dotyczących wątroby**
- **poradę, co należy zrobić, jeśli podczas leczenia lekiem Symago wystąpią działania niepożądane dotyczące wątroby.**

Należy poprosić lekarza o udzielenie dalszych informacji.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania leku Symago.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce dla pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceutce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Co należy zrobić przed zastosowaniem leku Symago

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby: w takim przypadku, nie należy przyjmować leku Symago.

Mogą istnieć inne powody, **dla których lek Symago może nie być odpowiedni dla pacjenta.**

Należy zwrócić się po poradę do lekarza w następujących sytuacjach:

- jeśli pacjent kiedykolwiek miał zaburzenia czynności wątroby,
- jeśli pacjent jest otyły lub ma nadwagę,
- jeśli pacjent ma cukrzycę,
- jeśli pacjent spożywa alkohol,
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki (o których wiadomo, że działają na wątrobę).

Co należy zrobić, aby podczas leczenia uniknąć zaburzeń czynności wątroby?

Należy regularnie wykonywać badania krwi.

Dlaczego?

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien zalecić badanie krwi, aby sprawdzić, czy wątroba pacjenta pracuje prawidłowo. Na podstawie wyników tych badań lekarz **określi stan wątroby** i zadecyduje, czy lek Symago jest odpowiednim lekiem dla pacjenta.

Podczas leczenia lekiem Symago, u niektórych pacjentów może się zwiększyć aktywność enzymów wątrobowych we krwi. Aktywność tych enzymów wskazuje na prawidłową lub nieprawidłową czynność wątroby oraz jest istotna dla lekarza do monitorowania leczenia.

Kiedy?

	Przed rozpoczęciem leczenia lub zwiększeniem dawki	Po około 3 tygodniach leczenia	Po około 6 tygodniach leczenia	Po około 3 miesiącach leczenia	Po około 6 miesiącach leczenia
Badania krwi	✓	✓	✓	✓	✓

Badania należy ponownie przeprowadzić, gdy lekarz zwiększy dawkę do 50 mg.

Należy pamiętać, aby zabrać broszurę dla pacjenta ze sobą na wizytę do lekarza.

Jeśli pacjent dowie się, że podczas leczenia zwiększyła się aktywność enzymów wątrobowych we krwi, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Należy zachować czujność odnośnie objawów zaburzenia czynności wątroby

Jeśli pacjent zaobserwuje którykolwiek z następujących objawów świadczących o tym, że wątroba może pracować nieprawidłowo:

- zażółcenie skóry lub oczu,
- ciemno zabarwiony mocz,
- jasne stolce,
- ból w prawej górnej części brzucha,
- nietypowe zmęczenie (zwłaszcza związane z innymi objawami wymienionymi powyżej)

⇒ **Należy natychmiast zwrócić się po poradę do lekarza, który może zalecić przerwanie stosowania leku Symago**

ROZKŁAD PLANOWANYCH BADAŃ KRWI

NALEŻY PAMIĘTAĆ

Ważne jest, aby podczas stosowania leku Symago regularnie wykonywać badania krwi. Poniższa tabela pomoże pamiętać o terminach badań krwi.

	Data
Symago 25 mg – data pierwszego przyjęcia leku	
Badania poziomu enzymów wątrobowych we krwi	
Pierwsze badanie (na początku leczenia)	
Drugie badanie (po około 3 tygodniach leczenia)	
Trzecie badanie (po około 6 tygodniach leczenia)	
Czwarte badanie (po około 3 miesiącach leczenia)	
Piąte badanie (po około 6 miesiącach leczenia)	

	Data
Zwiększenie dawki do 50 mg	
Badania poziomu enzymów wątrobowych we krwi	
Pierwsze badanie (na początku leczenia)	
Drugie badanie (po około 3 tygodniach leczenia)	
Trzecie badanie (po około 6 tygodniach leczenia)	
Czwarte badanie (po około 3 miesiącach leczenia)	
Piąte badanie (po około 6 miesiącach leczenia)	

Lekarz zdecyduje, czy należy przeprowadzić dalsze badania krwi.

Należy pamiętać, aby w przypadku wizyty u lekarza zabrać tę broszurę ze sobą.